

KALEIDO OSTBELGIEN INFORMIERT:

IMPFSCHUTZ GEGEN ROTAVIREN – FÜR SÄUGLINGE

Rotaviren gelten als die häufigsten Verursacher schwerer Magen-Darm-Erkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Je jünger das erkrankte Kind, desto höher ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.

Symptome der Erkrankung sind wässriger Durchfall, Erbrechen, in vielen Fällen auch Fieber

Der starke Verlust von Körperwasser kann einen Krankenhausaufenthalt erfordern. In Belgien sind zwei Impfstoffe gegen Rotaviren in Form von Schluckimpfungen verfügbar: Rotarix und RotaTeq. Diese variieren preislich und in ihrer Verabreichung. Der Belgische Hohe Gesundheitsrat empfiehlt folgende Verabreichung der Impfungen:

Rotarix® (GlaxoSmithKline) mit zwei Schluckimpfungen (die erste im Alter von zwei und die zweite im Alter von drei Monaten) oder **RotaTeq®** (Sanofi Pasteur MSD) mit drei Schluckimpfungen (je eine im Alter von zwei, drei und vier Monaten).

Für beide Impfstoffe gilt:

- Verabreichung mit einem Abstand von jeweils mindestens vier Wochen
- zeitgleiche Verabreichung mit der Sechsfachimpfung (Polio – Diphtherie – Tetanus – Keuchhusten – H. influenzae B – Hepatitis B) und der Impfung gegen Pneumokokken möglich
- Impfung erfolgt maximal bis zum sechsten Lebensmonat, eine Impfung älterer Kinder wird nicht empfohlen
- rezeptpflichtig

Eine Rückerstattung je nach Krankenkasse beträgt circa 25 Euro/Kind/Jahr. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, ob diese im Rahmen des Sonderbeitrags eine höhere Rückvergütung vorsieht. Auf Anfrage der Eltern verschreiben und verabreichen die Ärzte den Impfstoff in den Vorsorgestellen von Kaleido Ostbelgien. Natürlich kann auch der Haus- oder Kinderarzt die Impfung vornehmen.

KALEIDO OSTBELGIEN VOUS INFORME:

VACCINATION CONTRE LES ROTAVIRUS

POUR LES NOURRISSONS

Les rotavirus sont considérés comme la cause la plus fréquente de maladies gastro-intestinales graves chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le virus cause une diarrhée aqueuse, des vomissements et souvent de la fièvre. Il peut y avoir une déshydratation (perte d'eau corporelle) importante, pouvant nécessiter une hospitalisation. Plus l'enfant infecté est jeune, plus grand est le risque que l'évolution de la maladie soit grave.

En Belgique, il existe deux vaccins oraux contre le rotavirus, dont l'administration et le prix varient. Le Conseil National Supérieur de la Santé recommande l'administration des vaccins selon le schéma suivant:

Rotarix® (GlaxoSmithKline), 2 vaccins oraux à l'âge de 2 et 3 mois.

RotaTeq® (Sanofi Pasteur MSD), 3 vaccins oraux à l'âge de 2-3 et 4 mois.

- Le temps entre les différentes administrations doit comprendre au minimum 4 semaines pour les 2 vaccins.
- Les vaccinations orales peuvent être administrées en même temps que la vaccination hexavalente (polio, diphtérie, tétanos, coqueluche, H. influenzae B - hépatite B) et la vaccination contre le pneumocoque.
- Seuls les enfants jusqu'à l'âge de 6 mois sont vaccinés.
La vaccination des enfants plus âgés n'est pas recommandée.
- Prescription nécessaire.

Remboursement en fonction de la mutuelle : environ 25 € /enfant/an

Veillez-vous renseigner auprès de votre mutuelle, pour savoir si elle accorde un remboursement supplémentaire dans le cadre de l'assurance complémentaire. Les médecins de Kaleido Ostbelgien peuvent prescrire et administrer le vaccin à la demande des parents.

Le pédiatre ou le médecin traitant peut bien sûr également procéder à la vaccination.