



Foto: Ingimage 03C06080

Foto: AdobeStock_157180131

KALEIDO OSTBELGIEN
informiert:

Hodenhochstand





Hodenhochstand

Normalerweise wandert der Hoden in seiner Entwicklungsphase aus der Bauchhöhle in den Hodensack. Diese Phase ist meist mit der Geburt abgeschlossen, die Hoden befinden sich im Hodensack. Diese Entwicklung erfolgt spätestens in den ersten Lebensmonaten.

Es gibt Kinder, bei denen die Lage des Hodens von den normalen Verhältnissen abweicht.

Bauchhoden: Der Hoden bleibt in der Bauchhöhle liegen.

Leistenhoden: Der Hoden bleibt in der Leiste liegen.

Gleithoden: Der Hoden lässt sich aus dem Leistenkanal in den oberen Hodensack herabschieben, rutscht dann aber beim Loslassen wieder in den Leistenkanal zurück.

Pendelhoden: Der Hoden wird bei Kälte oder Berührung durch einen am Hoden ansetzenden Muskel in den Leistenkanal gezogen und wandert bei Entspannung des Muskels wieder in den Hodensack.

Welche Art des Hodenhochstands bei Ihrem Sohn vorliegt, wird der Kinderarzt feststellen, und dann eine entsprechende Therapie einleiten.



Verantwortliche Herausgeberin :

Murielle Mendez
Koordinatorin für die gesundheitliche Entwicklung
Gospertstraße 44 - 4700 Eupen

info@kaleido-ostbelgien.be
www.kaleido-ostbelgien.be



Auf Facebook:
Kaleido Ostbelgien